



Hengenahdistuksen pahenemisen syy paljastui kurkunpäästä



KUVA 1.



KUVA 2.

Seitsemänkymmentähdeksänvuotias keuhko-kohtaumatautiä sairastava nainen lähetettiin korva-, nenä- ja kurkkutautien päivystykseen kolmen vuorokauden aikana voimakkaasti pahentuneen hengenahdistuksen vuoksi. Vaiva ei ollut helpottanut lääkitysten avulla.

Potilaalla todettiin vaikeutunut sisäänhengitys. Kurkunpään tähytyksessä nähtiin sileäpintainen hengityksen tahdissa liikkuva muutos, joka työntyi äänihuulten väliin ja tukki ilmatien lähes kokonaan. Potilas intuboitiin paikallispuudutuksessa, ja muutos poistettiin laryngomikroskopiassa hiilidioksidilaseria käyttäen

(**KUVAT 1 ja 2**). Muutos osoittautui kystaksi, ja sen sisältä valui sameaa eritettä. Poiston jälkeen potilaan hengenahdistus helpotti välittömästi.

Ylähengitystieperäinen hengenahdistus on yleensä helppo erottaa keuhkoperäisestä syystä. Kurkunpään ahtauma aiheuttaa sisäänhengityksen vaikeutumisen ja stridorin. Tupakoivalla aikuispotilaalla syynä saattaa olla kurkunpääsyöpä. Hyvänlaatuinen kysta aiheuttaa harvoin näin voimakkaita oireita. ■

SANNA KEMPPAINEN, LL, erikoistuva lääkäri
TIMO ATULA, LT, dosentti, erikoislääkäri
HYKS, korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka



KUUKAUDEN KUVA -palstalla julkaistaan lukijoiden lähettämiä kuvia. Kuvaehdotuksia voi lähettää osoitteeseen lauri.saarela@duodecim.fi. Kuvan yhteyteen tulee liittää lyhyt teksti (max 100 merkkiä).