

PSYKKISET HÄIRIÖT JA TAIPUMUS VÄKIVALTAAN

ENGLANNISSA tutkittiin kansallisesta kohortista satunnaisesti poimitun kohderyhmän taipumusta väkivaltaiseen käyttäytymiseen ja sen yhteyttä psykiatriseen sairastamiseen (Am J Epidemiol 2006;164:1199). Tutkimus toteutettiin siten, että 2 000 potilaan ryhmä alkuperäisestä 8 397 henkilön satunnaiskohortista sai kysymyslomakkeen vastattavakseen. Vastausosuus oli 69,5 % ja 24 % kieltäytyi. Pieneen osaan, 6,5 %:iin, ei saatu yhteyttä.

Viimeisten viiden vuoden aikana 12 % haastatelluista kertoi käyttäytyneensä väkivaltaisesti. Väkivaltaisuus oli suhteessa alkoholi- ja huumeriippuvuuteen ja epäsosia-

liseen persoonallisuuteen. Alkoholi-riippuvuutta esiintyi 7 %:lla, huumeriippuvuutta 4 %:lla ja epäsosiaalinen persoonallisuus 4 %:lla, ja niihin liittyi 23 %:n, 15 %:n ja 15 %:n väkivaltariski. Väkivaltaisuutta esiintyi 56 %:lla niistä, joilla alkoholinkulutus oli erityisen suurta. Sen sijaan psykoositaipeeseen ei liittynyt väkivaltaista käyttäytymistä.

Tutkijat päättelivät, että väkivaltaisuuden vähentäminen edellyttää sen taustalla usein esiintyvän päihdeongelman hoitamista ja että puhtaasti psyykkisiin häiriöihin ei liity merkittävää väkivaltaisuutta. –EH