

TAKROLIMUUSI- JA PIMEKROLIMUUSIVOITEIDEN YHTEYDESTÄ LYMFoomIIN EI NÄYTTÖÄ

VAJAA VUOSI sitten Yhdysvalloissa tuli takrolimuusi- ja pimekrolimuusivoidepakkauksiin varoitus (black box), että voiteet saattavat lisätä vaaraa sairastua lymfoomaan ja ihosyöpiin. Sittemmin varoitus rantautui myös Eurooppaan. Se perustui joihinkin yksittäisiin havaintoihin.

Vastikään kerätyssä lähes 300 000:n atooppista ihottumaa sairastavan potilaan aineistossa lymfoomien lisääntymisestä ei kuitenkaan näy merkkiäkään (J Invest Dermatol 2006; doi:10.1038/sj.jid.5700622). Aineiston potilaista 294:llä oli lymfooma. Lymfooman esiintyminen korreloi atooppisen ihottuman vaikeuteen mutta

ei muihin tutkittuihin tekijöihin, joita olivat systeemiset glukokortikoidit, erittäin vahvat ja miedot glukokortikoidivoiteet, takrolimuusi- ja pimekrolimuusivoiteet sekä yhdistetty glukokortikoidi- ja pimekrolimuusi- tai takrolimuusivoidehoito.

Tulos vapauttaa kalsineuriiniinestäjävoiteet pannasta vasta osittain. Tieto vähentää kuitenkin voiteita määräävien lääkärin ja niitä käyttävien potilaiden epäietoisuutta voiteiden mahdollisista vaaroista. Epäilyn lopullista poistamista tai varmistamista saadaan valitettavasti odottaa vielä vuosia.

–MaHa