

Edellisen johdosta

KIITÄMME Kari Murrosta ja Rainer Fogelholmia mielenkiinnosta kirjoitustamme kohtaan. Kyseessä on selvästi Suomessa alidiagnosoitu ja alihoidettu ongelma. Tapauksia on esiintynyt varmasti useampia kuin yksi Jyväskylässä 1983 ja toinen Helsingissä 2005. Kirjoituksemme ilmestymisen ai-

kaan todettiin jälleen tapaus, joka johti subduraalihakematooman syntyyn ja tajuttomuuteen tältä pohjalta. Tällöinkin primaaridiagnosi epäonnistui.

Kyseisen päänsärkytyypin hoidoksi on suositeltu kirjallisuudessa mineralokortikoideja. Yhtään näyttöä antavaa tutkimusta

hoitojen hyödyllisyydestä ei ole, ja kaikki tieto hoidosta perustuukin klinikoiden kuvaamiin yksittäisiin tapauksiin. Deksametasonihoitoa kannattaa varmasti myös kokeilla lyhytaikaisesti ennen kirurgisia interventioita.

ANNETTE BEULE, LL,
erikoislääkäri, osastonlääkäri
annette.beule@hus.fi
HUS-Röntgen, syöpätautien klinikka
PL 180, 00029 HUS

MARKUS FÄRKKILÄ, dosentti, neurologian
erikoislääkäri, vastaava ylilääkäri
HYKS:n neurologian klinikka,
Meilahden sairaala
PL 340, 00029 HUS

LEENA VALANNE, dosentti,
neuroradiologian erikoislääkäri,
osastonylilääkäri
HUS Röntgen, Meilahden sairaala
PL 340, 00029 HUS